

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K.

25 Frs.

Supplément n° 1 au bulletin n° 120 de Septembre 1970

22 sept. 1970.

ARBRES FRUITIERS

ANTH. ONÔME DU POIRIER : Ce petit charançon destructeur de bourgeons floraux a généralement disparu de la plupart des cultures, mais dans les rares vergers contaminés il est conseillé d'effectuer une pulvérisation copieuse avec l'un des insecticides suivants :

- D D T : dose 100 gr. de matière active par hl de bouillie ;
- Méthoxychlore : 100 gr. " " " " ;
- Lindane : 12 gr. " " " " ;

Respecter strictement les dates limites d'emploi des insecticides avant récolte (Voir bulletin n° 115 d'Avril 1970).

COLZA

DESHERBAGE AMÉRICAINES : Nous rappelons que deux herbicides peuvent être utilisés sur colza pour la destruction des graminées adventices, ce sont :

Le DALAPON : Utilisé à la dose de 1,8 - 2,5 Kg de matière active à l'hectare et valable sur l'ensemble des graminées, y compris les repousses de céréales, ce produit doit être appliqué du stade cotylédonnaire au stade rosette du colza, avant que le bourgeon terminal se sépare du collet et dès que la majorité des graminées est levée.

Le Dalapon sensibilise le colza au froid et ne doit donc pas être utilisé trop tardivement.

Le T.C.A. : Utilisé à la dose de 5 à 7 Kg de matière active à l'hectare est efficace sur Vulpins jeunes, avant tallage. La végétation du colza doit être comprise entre le stade 2 à 3 feuilles (en plus des cotylédons) et le stade rosette.

Traiter lorsque le sol est humide et avant le début des fortes gelées.

Tenthrede de la rave : Les larves noirâtres de cet insecte causent parfois des dégâts importants sur le feuillage des jeunes colzas. En cas de nécessité, appliquer un traitement avec parathion, lindane ou roténone.

P. RIBOTEAU.

Dernière note : Bulletin n° 120 de Septembre 1970.

Les Ingénieurs Responsables
des Avertissements Agricoles.

PETIOT - TISSOT

L'Ingénieur d'Agronomie
Chef de la Circonscription phyto-
sanitaire "BOURGOGNE ET FRANCHE-
COMTÉ"

VARLET.

P 317